

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
1	Acrophylax zerberus BRAUER, 1867	Spezies		keine bekannt	
2	Adicella filicornis (PICTET, 1834)	Spezies		Leptocerus attenuatus STEPHENS, 1836 + Setodes eremita STEIN, 1873 + Erotosis italica NAVAS, 1934 + Setodes moestella McLACHLAN,	
3	Adicella reducta (McLACHLAN, 1865)	Spezies		Leptocerus bicolor STEPHENS, 1836 + Mystacides ferruginea E PICTET, 1865 + Adicella noguerana	
4	Agapetus delicatulus McLACHLAN, 1884	Spezies		keine bekannt	
5	Agapetus fuscipes CURTIS, 1834	Spezies		Agapetus odonturus NAVAS, 1917: SCHMID, 1950 + Rhyacophila incolor PICTET, 18 + Rhyacophila lanata PICTET, 1834 + Potamaria pictetii	
6	Agapetus laniger (PICTET, 1834)	Spezies		Agapetus pactus McLACHLAN, 1879	
7	Agapetus nimbulus McLACHLAN, 1879	Spezies		keine bekannt	
8	Agapetus ochripes CURTIS, 1834	Spezies		Agapetus comatus PICTET, 1834 + Hydroptila pumilio ZETTERSTEDT, 1840	
9	Agraylea multipunctata CURTIS, 1834	Spezies		Agraylea cognatella McLACHLAN, 1880 + Hydrorchestia argyricola KOLENATI, 1848	
10	Agraylea sexmaculata CURTIS, 1834	Spezies		Agraylea pallidula McLACHLAN, 1875 + Hydroptila flabellifera BREMI, 1864	
11	Agrypnia obsoleta (HAGEN, 1864)	Spezies		keine bekannt	
12	Agrypnia pagetana CURTIS, 1835	Spezies		Phryganea aegrota BURMEISTER, 1839 + Oligotricha strigosa RAMBUR, 1842	
13	Agrypnia picta KOLENATI, 1848	Spezies		Agrypnia islandica HAGEN, 1873	
14	Agrypnia varia FABRICIUS, 1793	Spezies		Phryganea detrita MOTSCHULSKI, 1853	
15	Allogamus auricollis auricollis (PICTET, 1834)	Spezies	nomino- typisches Taxon	Hallesus nigricornis HAGEN, 1848 (?)	
16	Allogamus auricollis braueri KOLENATI, 1859	Subspezies		Halesus brauerii KOLENATI, 1859 + Hallesus nigricornis HAGEN, 1848 (?)	
17	Allogamus ligonifer (McLACHLAN, 1876)	Spezies		Halesus productus NAVAS, 1918	
18	Allogamus stadleri (SCHMID, 1951)	Spezies		Halesus stadleri SCHMID, 1951	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
19	Allogamus uncatus (BRAUER, 1857)	Spezies		Hallesus nigricornis KOLENATI, 1848 + Halesus uncatus BRAUER, 1857 + Allogamus tomor OLAH & KOVACS, 2012 + Allogamus zugor OLAH, 2014	
20	Allotrichia pallicornis (EATON, 1873)	Spezies		Agraylea tauri JAQUEMART, 1965	
21	Anabolia brevipennis (CURTIS, 1834)	Spezies		Phacopteryx brevipennis + Phacopteryx granulata KOLENATI, 1848	
22	Anabolia furcata BRAUER, 1857	Spezies		Phryganea laevis ZETTERSTEDT, 1840	
23	Anabolia laevis (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		Anabolia sororcula McLachlan, 1876 + Phryganea brevis Zetterstedt, 1840 + Stathmophorus fuscus Kolenati, 1848	Neunachweis für Deutschland, (MEY, 2024)
24	Anabolia nervosa (CURTIS, 1834)	Spezies		Phryganea fusca PICTET, 1834 + Stathmophorus lapponicus KOLENATI, 1848 + Anabolia lurida STEPHENS, 1837 + Anabolia nigricornis STEPHENS, 1837	
25	Annitella obscurata (McLACHLAN, 1876)	Spezies		Chaetopteryx obscurata McLACHLAN, 1876	
26	Annitella thuringica (ULMER, 1909)	Spezies		keine bekannt	
27	Anomalopterygella chauviniana (STEIN, 1874)	Spezies		Anomalopteryx alacerrima SCHMID, 1952	
28	Apatania auricula FORSSLUND, 1930	Spezies		keine bekannt	
29	Apatania eatoniana McLACHLAN, 1880	Spezies		keine bekannt	
30	Apatania fimbriata (PICTET, 1834)	Spezies		Phryganea fontium HAGEN, 1859 + Apatania hagenii KOLENATI, 1859	
31	Apatania muliebris McLACHLAN, 1866	Spezies		Apatania mercantoura BOTOSANEANU & GIUDICELLI, 2004	
32	Apatania nielsenii SCHMID, 1954	Spezies		Apatania scherfi BURKHARDT & TOBIAS, 1982 und Nielsen (1950): Apatania muliebris McLachlan, 1966	
33	Athripsodes albifrons (LINNAEUS, 1758)	Spezies		Leptocerus albifrons LINNAEUS + Leptocerus interjectus McLACHLAN, 1881 + Phryganea interrupta McLACHLAN, 1813	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
34	Athripsodes aterrimus (STEPHENS, 1836)	Spezies		Leptocerus aterrimus STEPHENS + Leptocerus caliginosus STEPHENS, 1836 + Phryganea nigrafasciata RETZIUS, 1783	
35	Athripsodes bilineatus bilineatus (LINNAEUS, 1758)	Spezies	nomino- typisches Taxon	Athripsodes bilineatus LINNAEUS + Leptocerus affinis STEPHENS, 1836 + Phryganea bifasciata OLIVIER, 1791 + Leptocerus fulvoguttatus MOSELY, 1935 + Phryganea gallata FOURCROY, 1785 + Leptocerus noguerensis NAVAS, 1930	Subspezies <i>Athripsodes bilineatus aegus</i> MALICKY, 1999 nur in Südeuropa.
36	Athripsodes cinereus (CURTIS, 1834)	Spezies		Leptocerus cinereus CURTIS + Phryganea annulata GMELIN, 1789 + Mystacida rufina RAMBUR, 1842 + Leptocerus seminiger STEPHENS, 1836	
37	Athripsodes commutatus (ROSTOCK, 1874)	Spezies		Leptocerus commutatus ROSTOCK, 1874	
38	Athripsodes leucophaeus (RAMBUR, 1842)	Spezies		Homilia leucophaea (RAMBUR, 1842)	
39	Beraea maurus (CURTIS, 1834)	Spezies		keine bekannt	
40	Beraea pullata (CURTIS, 1834)	Spezies		Beraea albipes STEPHENS, 1836 + Beraea alticola VAILLANT, 1967 + Nais aterrima BRAUER, 1857 + Rhyacophila barbata PICTET, 1834 + Beraea marshamella STEPHENS, 1836 + Rhyacophila melas PICTET, 1834 + Phryganea minuta ZETTERSTEDT, 1840 + Rhyacophila nigrocincta PICTET, 1834 + Rhyacophila penicillus PICTET, 1834 + Phryganea pygmaea FABRICIUS, 1798	
41	Beraeodes minutus (LINNAEUS, 1761)	Spezies		Beraeamyia eideli DOEHLER, 1981	
42	Brachycentrus maculatus (FOURCROY, 1785)	Spezies		Lithax discretus NAVAS, 1921 + Rhyacophila nebulosa PICTET, 1834 + Dasystema pulchellum RAMBUR, 1842	
43	Brachycentrus montanus KLAPALEK, 1892	Spezies		Brachycentrus carpathicus DZIEDZIELEWICZ, 1895 + Silo sexguttata VON HEYDEN, 1896	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
44	Brachycentrus subnubilus CURTIS, 1834	Spezies		Brachycentrus caucasicus MARTYNOV, 1926 + Brachycentrus concolor STEPHENS, 1836 + Brachycentrus costalis STEPHENS, 1836 + Brachycentrus maracandicus McLACHLAN, 1875 + Hydronautia nubila KOLENATI, 1859 + Pogonostoma verum RAMBUR, 1842	
45	Ceraclea albimacula (RAMBUR, 1842)	Spezies		Leptocerus alboguttatus HAGEN, 1860 + Leptocerus bimaculatus STEPHENS, 1836 + Leptocerus biwaensis TSUDA & KUWAYAMA, 1950 + Leptocerus spinosus TSUDA, 1942 + Ceraclea morsei KUMANSKI, 1991 + Ceraclea alboguttata HAGEN, 1860	
46	Ceraclea annulicornis (STEPHENS, 1836)	Spezies		Athripsodes annulicornis STEPHENS + Leptocerus annulicornis STEPHENS + Leptocerus futilis BANKS, 1914 + Leptocerus lugens HAGEN, 1861 + Leptocerus recurvatus BANKS, 1908 + Mystacides perfusus KOLENATI, 1858	
47	Ceraclea dissimilis (STEPHENS, 1836)	Spezies		Athripsodes dissimilis STEPHENS + Leptocerus assimilis STEPHENS, 1836 + Leptocerus norfolki NAVAS, 1917 + Mystacides sericeus KOLENATI, 1858 + Mystacides uniguttatus PICTET, 1834 + Mystacida vetula RAMBUR, 1842	
48	Ceraclea fulva (RAMBUR, 1842)	Spezies		Leptocerus grossus McLACHLAN, 1862 + Leptocerus turanicus MARTYNOV, 1928 + Athripsodes fulva	
49	Ceraclea nigronevosa (RETZIUS, 1783)	Spezies		Athripsodes nigronevosa RETZIUS, 1783 + Phryganea barbata ZETTERSTEDT, 1840 + Phryganea fennica FABRICIUS, 1787 + Phryganea nevosa FOURCROY, 1785 + Phryganea pallida OLIVIER, 1791 + Mystacida venosa RAMBUR, 1842 +	
50	Ceraclea riparia (ALBARDIA, 1874)	Spezies		Leptocerus riparius ALBARDIA, 1874	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
51	<i>Ceraclea senilis</i> (BURMEISTER, 1839)	Spezies		<i>Leptocerus senilis</i> BURMEISTER, 1839 + <i>Leptocerus nygmaticus</i> NAVAS, 1917 + <i>Mystacides ochraceus</i> KOLENATI, 1858 + <i>Leptocerus spongillae</i> GARBINI, 1894	
52	<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i> <i>maclachlani</i> STEIN, 1874	Spezies	nomino- typisches Taxon	keine bekannt	Subspezies <i>Athripsodes bilineatus zaitzevi</i> MARTYNOV, 1916 nur im Uralgebiet.
53	<i>Chaetopteryx major</i> McLACHLAN, 1876	Spezies		<i>Chaetopteryx irregularis</i> KOLENATI, 1859	
54	<i>Chaetopteryx villosa villosa</i> (FABRICIUS, 1789)	Spezies	nomino- typisches Taxon	<i>Chaetopteryx fusca</i> SAHLBERG, 1894 + <i>Phryganea tuberculosa</i> PICTET, 1834 + <i>Chaetopteryx villosa gonzalezai</i> BOTOSANEANU, 1980	Subspezies <i>Chaetopteryx villosa gonzalezai</i> BOTOSANEANU, 1980 nur in Spanien.
55	<i>Cheumatopsyche lepida</i> (PICTET, 1834)	Spezies		<i>Cheumatopsyche atlantis</i> NAVAS, 1930 + <i>Tinodes albiguttatus</i> STEPHENS, 1836 + <i>Hydropsyche angustata</i> PICTET, 1834 + <i>Hydropsychodes atlantis</i> NAVAS, 1930 + <i>Catagapetus ? nigra</i> NAVAS, 1916 + <i>Hydropsyche varia</i> RAMBUR, 1842 + <i>Hydropsyche ventralis</i> CU	
56	<i>Chimarra marginata</i> (LINNAEUS, 1767)	Spezies		<i>Phryganea aurovittata</i> DUFOUR, 1841	
57	<i>Conosphyllax consors</i> McLACHLAN, 1880	Spezies		keine bekannt	
58	<i>Crunoecia irrorata irrorata</i> (CURTIS, 1834)	Spezies	nomino- typisches Taxon	<i>Sericostoma hirtum</i> PICTET, 1834 + <i>Mormonia minor</i> STEPHENS, 1836	Subspezies <i>Crunoecia irrorata sarda</i> MALICKY, 1981 nur auf Sardinien
59	<i>Crunoecia kempnyi</i> MORTON, 1901	Spezies		keine bekannt	
60	<i>Cryptothrix nebulicola</i> McLACHLAN, 1867	Spezies		<i>Drusus alpimar</i> BOTOSANEANU & GIUDICELLI, 1983	
61	<i>Cyrnus crenaticornis</i> (KOLENATI, 1859)	Spezies		keine bekannt	
62	<i>Cyrnus flavidus</i> McLACHLAN, 1864	Spezies		<i>Tinodes (Oncocerus) albigutta</i> KOLENATI, 1859 + <i>Tinodes (Oncocerus) tenuis</i> KOLENATI, 1859	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
63	Cyrnus insolutus McLACHLAN, 1878	Spezies		Cyrnus fenestratus RIS, 1893 + Philopotamus urbanus RAMBUR, 1842	
64	Cyrnus trimaculatus (CURTIS, 1834)	Spezies		Plectrocnemia atomaria KOLENATI, 1859 + Philopotamus flavomaculatus RAMBUR, 1842 + Cyrnus pulchellus STEPHENS, 1836 + Cyrnus unipunctatus STEPHENS, 1836	
65	Diplectrona felix McLACHLAN, 1878	Spezies		Aphelocheira flavomaculata STEPHENS, 1836	
66	Drusus annulatus (STEPHENS, 1837)	Spezies		Anabolia (Drusus) flavipennis STEPHENS, 1837 + Peltostomis sudetica KOLENATI, 1859 + Anabolia (Drusus) testaceus STEPHENS, 1837	
67	Drusus biguttatus (PICTET, 1834)	Spezies		Enoicyla limnophiloides BRAUER, 1857 + Drusus biguttatus teunissenii BOTOSANEANU & GIUDICELLI, 2004 + Potamorites biguttatus McLACHLAN	
68	Drusus chrysotus (RAMBUR, 1842)	Spezies		keine bekannt	
69	Drusus discolor (RAMBUR, 1842)	Spezies		Drusus bicolor NAVAS, 1918 + Drusus tricolor OBENBERGER, 1952	
70	Drusus monticola McLACHLAN, 1876	Spezies		keine bekannt	
71	Drusus trifidus McLACHLAN, 1868	Spezies		Drusus bifidus OBENBERGER, 1952 + Drusus borceai MURGOCI, 1960 + Drusus doehleri MAYER, 1936	
72	Ecclisopteryx dalecarlica KOLENATI, 1848	Spezies		keine bekannt	
73	Ecclisopteryx guttulata (PICTET, 1834)	Spezies		Ecclisopteryx guttata HAGEN, 1859 + Ecclisopteryx moravica KOLENATI, 1860 + Hallesus poecilus KOLENATI, 1848 + Ecclisopteryx dziedzielewiczi KLAPALEK, 1906	
74	Ecclisopteryx madida (McLACHLAN, 1867)	Spezies		keine bekannt	
75	Ecnomus deceptor McLACHLAN, 1884	Spezies		keine bekannt	
76	Ecnomus tenellus (RAMBUR, 1842)	Spezies		Ecnomus falcatus MOSELY, 1932	
77	Enoicyla pusilla (BURMEISTER, 1839)	Spezies		Dromophila montana VON HEYDEN, 1850 + Enoicyla sylvatica RAMBUR, 1842	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
78	Enoicyla reichenbachi (KOLENATI, 1848)	Spezies		Enoicyla amoena HAGEN, 1864	
79	Ernodes articularis (PICTET, 1834)	Spezies		Beraea martynovi MURGOCI & JUNCU, 1955	
80	Ernodes vicinus (McLACHLAN, 1879)	Spezies		keine bekannt	
81	Erotesis baltica McLACHLAN, 1877	Spezies		keine bekannt	
82	Glossosoma bifidum McLACHLAN, 1879	Spezies		Glossosoma beaumonti SCHMID, 1947	
83	Glossosoma boltoni CURTIS, 1834	Spezies		Glossosoma vernale PICTET, 1834 + Rhyacophila decolorata PICTET, 1834 + Glossosoma fimbriatum STEPHENS, 1836 + Tinodes obscurus STEPHENS, 1836 + Glossosoma serotinum NAVAS, 1930 + Rhyacophila vernalis PICTET, 1834	
84	Glossosoma conformis NEBOISS, 1963	Spezies		keine bekannt	
85	Glossosoma intermedium KLAPALEK, 1892	Spezies		Synaophora intermedia KLAPALEK, 1892	
86	Glyphotaelius pellucidus (RETZIUS, 1783)	Spezies		Phryganea argentata GMELIN, 1789 + Limnephilus basalis CURTIS, 1834 + Limnephilus emarginatus CURTIS, 1834	
87	Goera pilosa (FABRICIUS, 1775)	Spezies		Trichostomum auratum BURMEISTER, 1839 + Trichostoma capillata PICTET, 1834 + Silo flavipes CURTIS, 1833 + Lasiosoma fulvum RAMBUR, 1842 + Trichostoma fuscicorne PICTET, 1834 + Phryganea vulgata FOURCROY, 1785	
88	Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783)	Spezies		Phryganea irroratus ZETTERSTEDT, 1840 + Phryganea lineola VON PAULA SCHRANK, 1781 + Grammotaulius atomarius + Grammotaulius suarezi NAVAS, 1916 + Phryganea atomaria FABRICIUS, 1793	
89	Grammotaulius nitidus (MUELLER, 1764)	Spezies		Limnophilus gracilis BURMEISTER, 1839 + Phryganea lineola VON PAULA SCHRANK, 1781 + Phryganea strigosa GMELIN, 1789	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
90	Grammotaulius submaculatus (RAMBUR, 1842)	Spezies		Grammotaulius basilius NAVAS, 1917 + Limnophilus immaculatus NAVAS, 1912	
91	Hagenella clathrata (KOLENATI, 1848)	Spezies		'Anabolia' + Neuronina ruficrus SCOPOLI + Oligostomis melanoptera WALLENGREN, 1880	
92	Halesus digitatus digitatus (SCHRANK, 1781)	Spezies	nomino- typisches Taxon	Phryganea collaris VON PAULA SCHRANK, 1781 + Halesus hammoniensus ULMER, 1902 + Limnophilus hieroglyphicus CURTIS, 1834	Subspezies <i>Halesus digitatus caucasicus</i> OLAH, 1985 nur aus Vorderasien bekannt.
93	Halesus radiatus (CURTIS, 1834)	Spezies		Phryganea interpunctatus ZETTERSTEDT, 1840 + Halesus interpunctatus uniformis SCHMID, 1951	
94	Halesus rubricollis (PICTET, 1834)	Spezies		Halesus moestus McLACHLAN, 1876	
95	Halesus tessellatus (RAMBUR, 1842)	Spezies		keine bekannt	
96	Holocentropus dubius (RAMBUR, 1842)	Spezies		Philopotamus flavomaculatus RAMBUR, 1842 + Plectrocnemia irrorata KOLENATI, 1859 + Rhyacophila irrorella RAMBUR, 1842 + Polycentropus parfitti McLACHLAN, 1865 + Polycentropus pyrrhoceras HAGEN, 1861 + Polycentropus subnebulosus McLACHLAN, 1864	
97	Holocentropus insignis MARTYNOV, 1924	Spezies		keine bekannt	
98	Holocentropus picicornis (STEPHENS, 1836)	Spezies		Plectrocnemia liturata KOLENATI, 1859 + Cynus pulchellus STEPHENS, 1836 + Polycentropus subpunctatus STEPHENS, 1836 + Polycentropus irroratus STEPHENS, 1836	
99	Holocentropus stagnalis (ALBARDA, 1874)	Spezies		Plectrocnemia lituratus KOLENATI, 1859	
100	Hydatophylax infumatus (McLACHLAN, 1865)	Spezies		keine bekannt	
101	Hydropsyche angustipennis angustipennis (CURTIS, 1834)	Spezies	nomino- typisches Taxon	Hydropsyche aspersa RAMBUR, 1842 + Philopotamus fulvipes CURTIS, 1834 + Hydropsyche longipennis DEBAUCHE, 1935 + Hydropsyche nebulosa PICTET, 1834	Subspezies <i>Hydropsyche angustipennis mallorcana</i> MALICKY, 1980 nur auf Mallorca vorkommend.
102	Hydropsyche botosaneanui MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1966	Spezies		keine bekannt	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
103	<i>Hydropsyche bulbifera</i> McLACHLAN, 1878	Spezies		<i>Hydropsyche atrata</i> NAVAS, 1933 + <i>Hydropsyche fallaciosa</i> KUMANSKI & BOTOSANEANU, 1974 + <i>Hydropsyche mosulensis</i> MOSELY, 1934 + <i>Hydropsyche nebulosa</i> BRAUER (nec PICTET), 1857 + <i>Hydropsyche protecta</i> NAVAS, 1923 + <i>Hydropsyche subguttata</i> SCHMID	
104	<i>Hydropsyche bulgaromanorum</i> MALICKY, 1977	Spezies		keine bekannt	Meldungen von Arten der <i>Hydropsyche guttata</i> - Gruppe in Europa vor etwa 1970/75 sind sehr zweifelhaft, siehe MALICKY (1977). Bei den von Döhler und Eidel gemeldeten Funden von <i>Hydropsyche ornatula</i> McLACHLAN, 1878 dürfte es sich um Verwechslungen mit der sehr ähnlichen <i>H. bulgaromanorum</i> MALICKY, 1977 oder der im südlichen Deutschland vorkommenden <i>Hydropsyche guttata</i> PICTET, 1834 handeln.
105	<i>Hydropsyche contubernalis contubernalis</i> McLACHLAN, 1865	Spezies	nomino- typisches Taxon	unclear	Ältere Meldungen von „ <i>Hydropsyche contubernalis</i> “ können sich auch auf die Subspezies <i>Hydropsyche contubernalis masovica</i> MALICKY, 1977 beziehen, die ebenfalls in Deutschland vorkommt. Bei den beiden Meldungen von <i>Hydropsyche contubernalis borealis</i> MARTYNOV, 1926 für Hessen und Baden-Württemberg handelt es sich höchstwahrscheinlich um Fehlbestimmungen. <i>H. c. borealis</i> ist nur aus dem östlichen Europa bekannt.
106	<i>Hydropsyche contubernalis masovica</i> MALICKY, 1977	Subspezies		keine bekannt	Funde der Subspezies werden aus größeren Fließgewässern und Seen im Tiefland von Ukraine, Belarus, Polen, Norddeutschland, Benelux und Nordfrankreich gemeldet. Sichere Bestimmung adulter Tiere möglich mit NEU & TOBIAS (2004).
107	<i>Hydropsyche dinarica</i> MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1979	Spezies		<i>Hydropsyche sarnas</i> OLAH, 2014	
108	<i>Hydropsyche exocellata</i> DUFOUR, 1841	Spezies		<i>Hydropsyche ophthalmica</i> RAMBUR, 1842	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
109	<i>Hydropsyche fulvipes</i> (CURTIS, 1834)	Spezies		<i>Hydropsyche atomaria</i> KOLENATI, 1858	
110	<i>Hydropsyche guttata</i> PICTET, 1834	Spezies		<i>Hydropsyche adpersula</i> KOLENATI, 1858 + <i>Hydropsyche atomaria</i> STEPHENS, 1836 + <i>Hydropsyche danubii</i> BRAUER, 1857 + <i>Hydropsyche laeta</i> IMHOFF & LABRAM, 1838	
111	<i>Hydropsyche incognita</i> PITSCH, 1993	Spezies		keine bekannt	
112	<i>Hydropsyche instabilis</i> (CURTIS, 1834)	Spezies		<i>Hydropsyche atomaria</i> variety <i>obliquus</i> STEPHENS, 1836 + <i>Hydropsyche cinerea</i> PICTET, 1834 + <i>Hydropsyche hiberna</i> SCHMID, 1952 + <i>Hydropsyche lanceolata</i> McLACHLAN, 1865 + <i>Phryganea maculata</i> DONOVAN, 1813 + <i>Hydropsyche pallida</i> E PICTET, 1865	
113	<i>Hydropsyche pellucidula</i> s.str. (CURTIS, 1834)	Spezies		keine bekannt	<i>Hydropsyche pellucidula</i> s.str. (CURTIS, 1834) bezeichnet sicher bestimmte Exemplare dieser Art. Ältere Daten, die als „ <i>Hydropsyche pellucidula</i> “ gemeldet wurden, können die später beschriebenen Arten <i>Hydropsyche botosaneanui</i> MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1966, <i>Hydropsyche dinarica</i> MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1979 und <i>Hydropsyche incognita</i> PITSCH, 1993, umfassen.
114	<i>Hydropsyche saxonica</i> McLACHLAN, 1884	Spezies		<i>Hydropsyche bujori</i> MURGOI, 1960 + <i>Hydropsyche dentata</i> KUMANSKI, 1974	
115	<i>Hydropsyche silfvenii</i> (ULMER, 1906)	Spezies		keine bekannt	
116	<i>Hydropsyche siltalai</i> DOEHLER, 1963	Spezies		keine bekannt	
117	<i>Hydropsyche tenuis</i> NAVAS, 1932	Spezies		keine bekannt	
118	<i>Hydropsyche tobiasi</i> MALICKY, 1977	Spezies		keine bekannt	Letzter Nachweis aus dem Jahr 1938. Nachsuchen in Verbreitungsgebiet von <i>Hydropsyche tobiasi</i> MALICKY, 1977 blieben erfolglos, die Art muss als ausgestorben eingestuft werden.
119	<i>Hydroptila angulata</i> MOSELY, 1922	Spezies		<i>Hydroptila emarginata</i> MARTYNOV, 1927 + <i>Hydroptila bajgirana</i> BOTOSANEANU, 1983	
120	<i>Hydroptila cornuta</i> MOSELY, 1922	Spezies		keine bekannt	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
121	Hydroptila dampfi ULMER, 1929	Spezies		Hydroptila volgensis KACHALOVA & MUHAMETSINA, 1979	
122	Hydroptila forcipata (EATON, 1873)	Spezies		keine bekannt	
123	Hydroptila ivisa MALICKY, 1972	Spezies		keine bekannt	
124	Hydroptila lotensis MOSELY, 1930	Spezies		keine bekannt	
125	Hydroptila martini MARSHALL, 1977	Spezies		Hydroptila occulta sensu aucttorum nec EATON	
126	Hydroptila occulta (EATON, 1873)	Spezies		Hydroptila insignis MARTYNOV, 1927 + Hydroptila kimminsi MOSELY, 1930 + Hydroptila parthava SCHMID, 1959	
127	Hydroptila pulchricornis PICTET, 1834	Spezies		keine bekannt	
128	Hydroptila simulans MOSELY, 1920	Spezies		keine bekannt	
129	Hydroptila sparsa CURTIS, 1834	Spezies		Hydroptila brunneicornis STEPHENS, 1836	
130	Hydroptila tineoides DALMAN, 1819	Spezies		Phrixocoma femoralis EATON, 1873 + Hydroptila longispina McLACHLAN, 1884	
131	Hydroptila valesiaca SCHMID, 1946	Spezies		keine bekannt	
132	Hydroptila vectis CURTIS, 1834	Spezies		Hydroptila maclachlani KLAPALEK, 1891 + Hydroptila corsicana MOSELY, 1930	
133	Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837)	Spezies		keine bekannt	
134	Ithytrichia clavata MORTON, 1905	Spezies		Ithytrichia dovporiana BOTOSANEANU, 1980	
135	Ithytrichia lamellaris EATON, 1873	Spezies		Hydroptila brunneicornis PICTET, 1834	
136	Lepidostoma basale (KOLENATI, 1848)	Spezies		Lasiocephala bifida DECAMPS, 1972 + Sericostoma hirtum PICTET, 1834 + Goera irrorata KOLENATI, 1859 + Lasiocephala taurus COSTA, 1857	
137	Lepidostoma hirtum hirtum (FABRICIUS, 1775)	Spezies	nominoty pisches Taxon	Lasiocephala COSTA, 1857 + Goereodes ULMER, 1907 + Maniconeura McLACHLAN., 1875 + Mormonia fimbriata E PICTET, 1865 + Mormonia gracilicornis CURTIS, 1834 + Mormonia immaculata STEPHENS, 1836 + Lepidostoma lapponicum SILTALA, 1908 + Mormonia	Subspezies <i>Lepidostoma hirtum orientalis</i> MEY & JUNG, 1986 nur aus Vorderasien bekannt.

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
138	Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775)	Spezies		Leptocerus albonotatus VON HEYDEN, 1896 + Phryganea trifasciatus VON PAULA SCHRANK, 1802 + Mystacida trifasciata THEVENET, 1871 + Ymyia interrupta FABRICIUS, 1775	
139	Leptocerus lusitanicus (McLACHLAN, 1884)	Spezies		Setodes galaicus NAVAS, 1924	
140	Leptocerus tineiformis CURTIS, 1834	Spezies		Setodes aspersellus RAMBUR, 1842 + Leptocerus elongatus STEPHENS, 1836	
141	Limnephilus affinis CURTIS, 1834	Spezies		Goniotaulius anastomosis KOLENATI, 1848 + Chaetotaulius angustatus KOLENATI, 1848 + Limnephilus costalis STEPHENS, 1852 + Goniotaulius nigrovittatus KOLENATI, 1859 + Limnephilus paonius DENNING, 1949	
142	Limnephilus algosus (McLACHLAN, 1868)	Spezies		Stenophylax crudus McLACHLAN, 1875 + Astenophylina kashmira MOSELY, 1936 + Limnephilus innuitorum NIMMO, 1991	
143	Limnephilus auricula CURTIS, 1834	Spezies		Limnephilus geminus STEPHENS, 1837 + Limnephila guttata RAMBUR, 1842 + Phryganea nigridora PICTET, 1834 + Limnephilus obscurus CURTIS, 1834 + Limnephilus signatus STEPHENS, 1837	
144	Limnephilus binotatus CURTIS, 1834	Spezies		Limnephilus xanthodes McLACHLAN, 1873: NEBOISS, 1963 + Chaetotaulius borealis KOLENATI, 1848	
145	Limnephilus bipunctatus CURTIS, 1834	Spezies		Limnophilus barbatus MARTYNOV, 1917 + Lasiocephalus basalis HOEPFNER & LE ROI, 1912 + Limnophilus diacanthus NAVAS, 1917 + Phryganea discoidea ZETTERSTEDT, 1840 + Limnephila obscura RAMBUR, 1842 + Limnophilus tuberculatus BRAUER, 1857	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
146	Limnephilus centralis CURTIS, 1834	Spezies		Limnephilus audeus BOTOSANEANU, 2000 + Limnephilus bipartitus CURTIS, 1834 + Limnephilus elongatus STEPHENS, 1837 + Limnephilus flavus LINNAEUS, 1758 + Limnephilus fuliginosus STEPHENS, 1837 + Limnephilus ochraceus CURTIS, 1834 + Limnephilus p	
147	Limnephilus coenosus CURTIS, 1834	Spezies		Asynarchus coenosus CURTIS + Stenophylax arcticus KOLENATI, 1848 + Anabolia coenosus variety paludum KOLENATI, 1859	
148	Limnephilus decipiens (KOLENATI, 1848)	Spezies		Phryganea bimaculata SCOPOLI not LINNAEUS, 1763 + Limnephilus decipiens FISCHER, 1968 + Phryganea binotata OLIVIER, 1791 + Chaetotaulius nobilis BRAUER not KOLENATI, 1855	
149	Limnephilus dispar McLACHLAN, 1875	Spezies		Limnephilus acrocurvus DENNING, 1942 + Limnephilus zhitkovi MARTYNOV, 1914 + Stenophylax nigradorsus KOLENATI, 1848 + Stenophylax minusculus BANKS, 1907 + Limnephilus minusculus BANKS	
150	Limnephilus elegans CURTIS, 1834	Spezies		Limnephilus bicolor WOOD, 1876 + Phryganea signifer ZETTERSTEDT, 1840	
151	Limnephilus externus HAGEN, 1861	Spezies		Limnephilus congener McLACHLAN, 1875 + Limnephilus luteolus BANKS, 1899 + Limnephilus oslari BANKS, 1907 + Limnephilus tersus BETTEN, 1934	
152	Limnephilus extricatus McLACHLAN, 1865	Spezies		keine bekannt	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
153	Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)	Spezies		Limnophilus apicalis MARTYNOV, 1924 nec CURTIS, 1834 + Limnephilus sibiricus occidentis SPURIS, 1989 + Limnephilus dorsalis STEPHENS, 1837 + Phryganea fusca ROTHSCCHILD, 1878 + Phryganea testacea COSTA, 1847 + Phryganea viridiventris DUFOUR, 1841	
154	Limnephilus fuscicornis (RAMBUR, 1842)	Spezies		Limnophilus cingulatus BRAUER, 1857 + Desmotaulius fumigatus KOLENATI, 1848 + Phryganea fusca ZETTERSTEDT, 1840 + Limnophilus rubricollis BURMEISTER, 1839	
155	Limnephilus fuscinervis (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		Colpotaulius vulsellus KOLENATI, 1848	
156	Limnephilus germanus McLACHLAN, 1875	Spezies		Limnephilus luniger THOMSON, 1891	
157	Limnephilus griseus (LINNAEUS, 1758)	Spezies		Limnephilus bipunctatus STEPHENS, 1837 + Limnephilus fenestralis CURTIS, 1834 + Limnephilus luniger STEPHENS, 1837 + Limnephilus marginalis STEPHENS, 1837 + Limnephilus obliquus STEPHENS, 1837 + Limnephilus signatus STEPHENS, 1837 + Limnephila	
158	Limnephilus hirsutus (PICTET, 1834)	Spezies		keine bekannt	
159	Limnephilus ignavus McLACHLAN, 1865	Spezies		Halesus rivularis NAVAS, 1917	
160	Limnephilus incisus CURTIS, 1834	Spezies		Colpotaulius incisus CURTIS, 1834 + Colpotaulius excisus KOLENATI, 1848 + Limnephila striolata RAMBUR, 1842	
161	Limnephilus italicus McLACHLAN, 1884	Spezies		keine bekannt	
162	Limnephilus lunatus CURTIS, 1834	Spezies		Limnephilus apicalis CURTIS, 1834 + Limnephila flavida RAMBUR, 1842 + Phryganea lunaris PICTET, 1834 + Limnephilus nebulosus CURTIS, 1834	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
163	<i>Limnephilus luridus</i> CURTIS, 1834	Spezies		<i>Limnephilus irroratus</i> STEPHENS, 1837	
164	<i>Limnephilus marmoratus</i> CURTIS, 1834	Spezies		<i>Phryganea atomaria</i> ZETTERSTEDT, 1840 + <i>Limnephilus discoidalis</i> CURTIS, 1834 + <i>Phryganea maculata</i> COSTA, 1847 + <i>Limnephilus</i> (<i>Chaetotaulius</i>) <i>vitrat</i> WALKER, 1852 + <i>Limnephila vitrea</i> RAMBUR, 1842	
165	<i>Limnephilus nigriceps</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		<i>Limnephilus forcipatus</i> BANKS, 1924 + <i>Chaetotaulius striola</i> KOLENATI, 1848	
166	<i>Limnephilus pati</i> O'CONNOR, 1980	Spezies		<i>Limnephilus eidelii</i> TOBIAS, 1981	
167	<i>Limnephilus politus</i> McLACHLAN, 1865	Spezies		<i>Goniotaulius concentricus</i> KOLENATI, 1848	
168	<i>Limnephilus quadratus</i> MARTYNOV, 1914	Spezies		keine bekannt	
169	<i>Limnephilus rhombicus rhombicus</i> (LINNAEUS, 1758)	Spezies	nominoty- pisches Taxon	<i>Limnephilus chilcotinensis</i> NIMMO, 1991 + <i>Limnephilus combinatus</i> WALKER, 1852 + <i>Phryganea rhomboidica</i> BERKENHOUT, 1795	Subspezies <i>Limnephilus rhombicus reseri</i> MALICKY, 1985 aus den (Süd-)Westalpen bekannt, in Deutschland noch nicht nachgewiesen.
170	<i>Limnephilus sericeus</i> (SAY, 1824)	Spezies		<i>Anabolia decepta</i> BANKS, 1899 + <i>Limnephilus</i> <i>despectus</i> WALKER, 1852 + <i>Limnephilus eminens</i> BETTEN, 1934 + <i>Apatania fuscostigma</i> MATSAMURA, 1931 + <i>Limnephilus multifarius</i> WALKER, 1852 + <i>Limnephilus perforatus</i> WALKER, 1852 + <i>Phryganea pilosula</i> ZETT.	
171	<i>Limnephilus sparsus</i> CURTIS, 1834	Spezies		<i>Limnephilus flavescens</i> STEPHENS, 1837 + <i>Limnephilus fuscatus</i> STEPHENS, 1837 + <i>Limnephilus fuscus</i> STEPHENS, 1837 + <i>Limnephilus cianficconiae hispaniae</i> BOTOSANEANU, 2004 + <i>Desmotaulius megerlei</i> KOLENATI, 1848 + <i>Limnephilus paramushirensis</i> TSUDA	
172	<i>Limnephilus stigma</i> CURTIS, 1834	Spezies		<i>Limnephila fulva</i> RAMBUR, 1842 + <i>Goniotaulius</i> <i>stigmaticus</i> KOLENATI, 1848	
173	<i>Limnephilus subcentralis</i> (BRAUER, 1857)	Spezies		keine bekannt	
174	<i>Limnephilus tauricus</i> SCHMID, 1964	Spezies		<i>Limnephilus hirsutoides</i> SVENSSON, 1971	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
175	Limnephilus vittatus (FABRICIUS, 1798)	Spezies		Limnephilus consobrinus CURTIS, 1834 + Phryganea elegans PICTET, 1834 + Limnephilus nigrivittatus STEPHENS, 1837 + Limnephilus notatus STEPHENS, 1837 + Limnephilus praeustus STEPHENS, 1837 + Phryganea subpunctulatus ZETTERSTEDT, 1840	
176	Lithax niger (HAGEN, 1859)	Spezies		Aspatherium frigidum MEYER-DUER, 1864	
177	Lithax obscurus (HAGEN, 1859)	Spezies		Lithax fuscipes ROSTOCK, 1879	
178	Lype phaeopa (STEPHENS, 1836)	Spezies		Psychomia derelicta McLACHLAN, 1863 + Anticyra gracilipes STEPHENS, 1836 + Beraea melas BRAUER, 1857 + Lype phaeopa meridionalis MORETTI, 1986 + Tinodes (Homoeocerus) pusillus KOLENATI, 1859 + Lype sinuata McLACHLAN, 1878 + Cynus urbanus STEP	
179	Lype reducta (HAGEN, 1868)	Spezies		Lype flavospinosa MOSELY, 1930	
180	Melampophylax melampus (McLACHLAN, 1867)	Spezies		keine bekannt	
181	Melampophylax mucoreus (HAGEN, 1861)	Spezies		Melampophylax guttatipennis McLACHLAN + Halesus guttatipennis McLACHLAN, 1865 + Halesus helveticus MEYER-DUER, 1875	
182	Melampophylax nepos nepos (McLACHLAN, 1880)	Spezies	nominoty pisches Taxon	keine bekannt	Subspezies <i>Melampophylax nepos triangulifera</i> BOTOSANEANU, 1957 nur aus den Nordkarpaten bekannt.
183	Mesophylax impunctatus impunctatus McLACHLAN, 1884	Spezies	nominoty pisches Taxon	keine bekannt	Subspezies <i>Mesophylax impunctatus aduncus</i> NAVAS, 1923 nur in Südost-Europa, 1923 und <i>Mesophylax impunctatus zetlandicu</i> s McLACHLAN, 1884 nur auf den britischen Inseln vorkommend.
184	Metanoea rhaetica SCHMID, 1955	Spezies		keine bekannt	
185	Micrasema longulum McLACHLAN, 1876	Spezies		Micrasema gabusi SCHMID, 1952	
186	Micrasema minimum McLACHLAN, 1876	Spezies		Micrasema exiguus McLACHLAN, 1876 + Beraea valirana NAVAS, 1917	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
187	Micrasema morosum (McLACHLAN, 1868)	Spezies		Micrasema tristellum McLACHLAN, 1876	
188	Micrasema setiferum (PICTET, 1834)	Spezies		Hydronautia maculata concolor KOLENATI, 1848 + Dasystoma nigrum BRAUER, 1857 + Micrasema nigrum BRAUER, 1857	
189	Micropterna fissa McLACHLAN, 1875	Spezies		Stenophylax fissus McLACHLAN, 1875 + Micropterna fuscata NAVAS, 1926	
190	Micropterna lateralis (STEPHENS, 1834)	Spezies		Halesus latipennis STEPHENS, 1837 + Stenophylax lateralis (STEPHENS, 1837)	
191	Micropterna nycterobia (McLACHLAN, 1875)	Spezies		Stenophylax nycterobius McLACHLAN, 1875 + Micropterna bofilli NAVAS, 1919 + Stenophylax striatus KOLENATI, 1848 + Micropterna ventralis NAVAS, 1915	
192	Micropterna sequax (McLACHLAN, 1875)	Spezies		Stenophylax sequax McLACHLAN, 1875 + Micropterna affinis MURGOCI, 1951 + Micropterna lateralis VON ZUR MUEHLEN, 1880 + Micropterna taeniata NAVAS, 1917	
193	Micropterna testacea (GMELIN, 1790)	Spezies		Stenophylax testaceus GMELIN, 1789 + Phryganea brunnea OLIVIER, 1791 + Mesophylax impunctatus DOEHLER, 1914 + Micropterna orophila STEIN, 1874	
194	Microptila minutissima RIS, 1897	Spezies		keine bekannt	
195	Molanna albicans (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		Molanna distinguenda WALLENGREN + Molanna palpata McLACHLAN, 1877	
196	Molanna angustata CURTIS, 1834	Spezies		Molanna nigripalpis STEPHENS, 1836 + Nais plicata RAMBUR, 1842 + Phryganea vestita ZETTERSTEDT, 1840	
197	Molanna nigra (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		Molanna carbonia McLACHLAN, 1877	
198	Molannodes tinctus (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		Molannodes bergi ROSS, 1952 + Molannodes steinii McLACHLAN, 1872 + Molannodes zelleri McLACHLAN, 1866	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
199	Mystacides azurea (LINNAEUS, 1761)	Spezies		Mystacides azureus + Mystacides atra DZIEDZIELEWICZ, 1877 + Mystacide nigra PICTET, 1834 + Phryganea nigrocoerulea RETZIUS, 1783	
200	Mystacides longicornis (LINNAEUS, 1758)	Spezies		Mystacides concolor BURMEISTER, 1839 + Mystacides leucopterus McLACHLAN, 1884 + Phryganea minuta ZETTERSTEDT, 1840 + Mystacides monochrous McLACHLAN, 1880 + Phryganea nigrafasciata RETZIUS, 1783 + Phryganea quadrifasciata FABRICIUS, 1775	
201	Mystacides nigra (LINNAEUS, 1758)	Spezies		Leptocerus nigricans STEPHENS, 1836 + Leptocerus obtusus STEPHENS, 1836 + Phryganea plumosa SULZER, 1776	
202	Nemotaulius punctatolineatus (RETZIUS, 1783)	Spezies		Phryganea binervosus DE VILLERS, 1789 + Limnephilus laevis WALKER, 1852 + Phryganea punctatus OLIVIER, 1791 + Glyphidotaulius umbraculum KOLENATI, 1848	
203	Neureclipsis bimaculata (LINNAEUS, 1758)	Spezies		Polycentropus concolor BURMEISTER, 1839 + Phryganea noctuaeformis VON PAULA SCHRANK, 1802 + Anticyra? robusta WALKER, 1852 + Phryganea tigurinensis FABRICIUS, 1798 + Philopotamus variegatus SCHOCH, 1884	
204	Notidobia ciliaris (LINNAEUS, 1761)	Spezies		Phryganea atra FOURCROY, 1785 + Phryganea atrata FABRICIUS, 1793	
205	Odontocerum albicorne (SCOPOLI, 1763)	Spezies		Mystacide cylindrica PICTET, 1834 + Odontocerum griseum LEACH, 1815 + Molanna albicornis incanus KOLENATI, 1859 + Crenogenes incomtus IMHOFF & LABRAM, 1838 + Odontocerus maculipennis CURTIS, 1834	
206	Oecetis furva (RAMBUR, 1842)	Spezies		Mystacides filus BURMEISTER, 1839 + Setodes intaminata McLACHLAN, 1865	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
207	Oecetis lacustris (PICTET, 1834)	Spezies		Oecetis lacustris orientalis MARTYNOV, 1935 + Oecetis lacustris martinovi YANG & MORSE, 2000	
208	Oecetis notata (RAMBUR, 1842)	Spezies		Oecetis notulata NAVAS, 1933	
209	Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)	Spezies		Oecetis albescens MOSELY, 1930 + Oecetis ochracea carri MILNE, 1934 + Phryganea hectica ZETTERSTEDT, 1840 + Mystacida obsoleta RAMBUR, 1842 + Phryganea pilosa MUELLER, 1776 + Oecetis vicaria NEAVE, 1934	
210	Oecetis strucki KLAPALEK, 1903	Spezies		Oecetis struckii KLAPALEK, 1903	
211	Oecetis testacea (CURTIS, 1834)	Spezies		keine bekannt	
212	Oecetis tripunctata (FABRICIUS, 1793)	Spezies		Oecetis alexanderi KUMANSKI, 1976 + Oecetis buitenzorgensis ULMER, 1951 + Oecetis caelum CHEN & MORSE, 1991 + Setodes punctatella RAMBUR, 1842	
213	Oecismus monedula monedula (HAGEN, 1859)	Spezies	nominoty pisches Taxon	keine bekannt	Subspezies <i>Oecismus monedula pinkeri</i> MALICKY, 1976 nur in Südost-Europa.
214	Oligostomis reticulata (LINNAEUS, 1761)	Spezies		Neuronia stalii McLACHLAN, 1868 + Oligostomis stalii McLACHLAN, 1868	
215	Oligotricha striata (LINNAEUS, 1758)	Spezies		Phryganea analis FABRICIUS, 1775 + Oligotricha chloronevra RAMBUR, 1842 + Neuronia ruficrus SCOPOLI, 1763 + Neuronia fusca STEPHENS, 1837 + Phryganea ruficrus SCOPOLI, 1763 + Phryganea striata LINNAEUS, 1758	
216	Orthotrichia angustella (McLACHLAN, 1865)	Spezies		Hydroptila brunneicornis PICTET, 1834	
217	Orthotrichia costalis (CURTIS, 1834)	Spezies		Orthotrichia tetensii KOLBE, 1887	
218	Orthotrichia tragetti MOSELY, 1930	Spezies		keine bekannt	
219	Oxyethira distinctella McLACHLAN, 1880	Spezies		keine bekannt	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
220	Oxyethira falcata MORTON, 1893	Spezies		Oxyethira assia BOTOSANEANU & MOUBAYED, 1985 + Oxyethira bidentata NYBOM, 1948 + Oxyethira boreella SVENSSON & TJEDER, 1975 + Oxyethira dentata NYBOM, 1954 + Oxyethira rhodani SCHMID, 1947	
221	Oxyethira flavicornis (PICTET, 1834)	Spezies		Hydroptila flavicornis + Oxyethira costalis EATON, 1873	
222	Oxyethira frici KLAPALEK, 1891	Spezies		keine bekannt	
223	Oxyethira sagittifera RIS, 1897	Spezies		keine bekannt	
224	Oxyethira simplex (RIS, 1897)	Spezies		keine bekannt	
225	Oxyethira tristella KLAPALEK, 1895	Spezies		keine bekannt	
226	Parachiona picicornis (PICTET, 1834)	Spezies		Limnephila nigrita RAMBUR, 1842 + Phryganea puberula ZETTERSTEDT, 1840	
227	Philopotamus ludificatus McLACHLAN, 1878	Spezies		keine bekannt	
228	Philopotamus montanus montanus (DONOVAN, 1813)	Spezies	nominoty pisches Taxon	Phryganea charpentieri ZETTERSTEDT, 1840 + Philopotamus scopulorum STEPHENS, 1836 + Philopotamus tigrinus BRAUER, 1857	Bislang sind von <i>Ph. montanus</i> neun Subspezies aus ganz Europa beschrieben, für Deutschland wurde bislang nur die Nominatform <i>Philopotamus montanus montanus</i> (DONOVAN, 1813) gemeldet.
229	Philopotamus variegatus variegatus (SCOPOLI, 1763)	Spezies	nominoty pisches Taxon	Philopotamus pedemontanus NAVAS, 1934	Subspezies <i>Philopotamus variegatus amphilectus</i> McLACHLAN, 1884, <i>Ph. v. flavidus</i> HAGEN, 1864 und <i>Ph. v. hispanicus</i> McLACHLAN, 1878 nur in Südeuropa vorkommend.
230	Phryganea bipunctata RETZIUS, 1783	Spezies		Phryganea striata auct. nec. L. + Phryganea beckwithii STEPHENS, 1836 + Phryganea fulvipes BURMEISTER, 1839	
231	Phryganea grandis grandis LINNAEUS, 1758	Spezies	nominoty pisches Taxon	Phryganea atomaria STEPHENS, 1836 + Phryganea uncinata VON PAULA SCHRANK, 1781 + Phryganea grandis meridionalis KLAPALEK, 1899	Aus Deutschland bislang nur die Nominatform <i>Phryganea grandis grandis</i> LINNAEUS, 1758 bekannt, vier beschriebene Subspezies nur in Süd- und Südosteuropa vorkommend.
232	Plectrocnemia appennina McLACHLAN, 1884	Spezies		keine bekannt	
233	Plectrocnemia brevis McLACHLAN, 1871	Spezies		Plectrocnemia brevis gracilligonopoda BOTOSANEANU, 1960	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
234	<i>Plectrocnemia conspersa conspersa</i> (CURTIS, 1834)	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Plectrocnemia atomaria</i> WALSER, 1864 + <i>Plectrocnemiella carelica</i> NYBOM, 1950 + <i>Hydropsyche senex</i> PICTET, 1834 + <i>Crunophila</i> <i>torrentium</i> KOLENATI, 1859 + <i>Plectrocnemia</i> <i>limosa</i> VAILLANT, 1967.	Subspezies <i>Plectrocnemia conspersa keftiu</i> MALICKY, 1974 nur auf Kreta vorkommend.
235	<i>Plectrocnemia geniculata geniculata</i> McLACHLAN, 1871	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Plectrocnemia geniculata prealpina</i> BOTOSANEANU & GIUDICELLI, 2004 (MALICKY, H., in litt. 2016-04)	Vier Subspezies beschrieben, von denen <i>Plectrocnemia</i> <i>geniculata almoravida</i> MALICKY, 1986 in Portugal, Spanien und Frankreich vorkommt und mehrfach aus den Ardennen gemeldet wurde. Ein Vorkommen in angrenzenden Gebieten Deutschlands ist nicht ausgeschlossen. <i>Plectrocnemia geniculata calabrica</i> MALICKY, 1971, <i>Pl. G. corsicana</i> MOSELY, 1930 und <i>Pl.</i> <i>G. factiosa</i> MORETTI, 1991 sind in Südeuropa und Nordafrika verbreitet.
236	<i>Polycentropus excisus</i> KLAPALEK, 1894	Spezies		keine bekannt	
237	<i>Polycentropus flavomaculatus</i> <i>flavomaculatus</i> (PICTET, 1834)	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Phryganea atomaria</i> VON PAULA SCHRANK, 1802 + <i>Hydropsyche brevicollis</i> PICTET, 1834 + <i>Polycentropus concinnus</i> STEPHENS, 1836 + <i>Polycentropus fuliginosus</i> STEPHENS, 1836 + <i>Plectrocnemia irrorata</i> BRAUER, 1857 + <i>Polycentropus multiguttatus</i> CURTIS, 183	Von <i>Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus</i> (PICTET, 1834) sind neun Subspezies beschrieben, für Deutschland wurde bislang nur die Nominatform gemeldet.
238	<i>Polycentropus irroratus</i> CURTIS, 1835	Spezies		<i>Polycentropus multiguttatus</i> McLACHLAN nec. CURTIS: NEBOISS, 1963 + <i>Polycentropus</i> <i>flavomaculatus</i> (PICTET, 1834)	
239	<i>Polycentropus schmidi</i> NOVAK & BOTOSANEANU, 1965	Spezies		keine bekannt	
240	<i>Potamophylax cingulatus alpinus</i> TOBIAS, 1994	Subspezies		keine bekannt	Es sind vier Unterarten beschrieben, von denen <i>Potamophylax cingulatus alpinus</i> TOBIAS, 1994 im Alpenraum, also auch im südlichen Deutschland vorkommt. Die Verbreitung der Arten und Unterarten ist sehr unklar.

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
241	<i>Potamophylax cingulatus cingulatus</i> (STEPHENS, 1837)	Spezies	nominoty pisches Taxon	keine bekannt	Verbreitung von <i>Potamophylax cingulatus cingulatus</i> (STEPHENS, 1837) im südlichen Deutschland unklar.
242	<i>Potamophylax latipennis</i> (CURTIS, 1834)	Spezies		<i>Phryganea fasciata</i> GMELIN, 1789 + <i>Phryganea guttifera</i> ZETTERSTEDT, 1840 + <i>Phryganea laciniosa</i> GMELIN, 1789 + <i>Phryganea pantherina</i> PICTET, 1834 + <i>Limnephilus stellatus</i> CURTIS, 1834 + <i>Stenophylax latipennis</i> CURTIS	
243	<i>Potamophylax luctuosus luctuosus</i> (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Stenophylax pantherinus</i> variety <i>brittingeriana</i> KOLENATI, 1848 + <i>Stenophylax excisus</i> MARTYNOV, 1926 + <i>Stenophylax pantherinus</i> variety <i>geometrina</i> KOLENATI, 1848 + <i>Anabolia gigantea</i> BRAUER, 1857 + <i>Stenophylax luctuosus</i> PILLER & MITTERPACHER	Die Subspezies <i>Potamophylax luctuosus armeniacus</i> MEY, 1979 kommt nur in Südost-Europa vor.
244	<i>Potamophylax nigricornis</i> (PICTET, 1834)	Spezies		<i>Stenophylax areatus</i> KOLENATI, 1856	Die morphologischen Merkmale der Arten <i>Potamophylax apados</i> , <i>elegantulus</i> , <i>fules</i> , <i>fureses</i> , <i>hasas</i> , <i>horgos</i> , <i>kethas</i> , <i>lemezes</i> , <i>mista</i> , <i>peremes</i> , <i>simas</i> , <i>tuskes</i> , <i>testaceus</i> und <i>ureges</i> , die in OLAH (2013) erwähnt werden, liegen im Variationsbereich von <i>Potamophylax nigricornis</i> (PICTET, 1834). Möglicherweise Synonyme. Weitere Untersuchungen der <i>Potamophylax nigricornis</i> -Gruppe erforderlich.
245	<i>Potamophylax rotundipennis</i> (BRAUER, 1857)	Spezies		<i>Stenophylax hieroglyphicus</i> PREUDHOMME DE BORRE, 1871 + <i>Stenophylax pilosus</i> KOLENATI, 1848	
246	<i>Pseudopsilopteryx zimmeri</i> (McLACHLAN, 1876)	Spezies		keine bekannt	
247	<i>Psilopteryx psorosa psorosa</i> (KOLENATI, 1860)	Spezies	nominoty pisches Taxon	keine bekannt	<i>Psilopteryx psorosa psorosa</i> (KOLENATI, 1860) kommt in Deutschland nur im östlichen Bayern und Sachsen vor. Ihre fünf beschriebenen Unterarten haben Populationen im Osten entlang des Karpatenbogens.

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
248	<i>Psychomyia fragilis</i> (PICKET, 1834)	Spezies		<i>Metalyte fragilis</i> PICKET, 1834 + <i>Psychomyia urbana</i> HAGEN, 1860	
249	<i>Psychomyia pusilla</i> (FABRICIUS, 1781)	Spezies		<i>Psychomyia acuta</i> PICKET, 1834 + <i>Psychomyia annulicornis</i> PICKET, 1834 + <i>Psychomyia bifurcata</i> MOSELY, 1938 + <i>Anticyra ciliaris</i> STEPHENS, 1836 + <i>Anticyra gracilipes</i> CURTIS, 1834 + <i>Anticyra latipes</i> CURTIS, 1834 + <i>Psychomyia shelkovnikovi</i> MARTYNOV	
250	<i>Ptilocolepus granulatus</i> (PICKET, 1834)	Spezies		<i>Ptilocolepus funereus</i> KOLENATI, 1859 + <i>Ptilocolepus turbidus</i> KOLENATI, 1848 + <i>Ptilocolepus villosus</i> NAVAS, 1916	
251	<i>Rhadicleptus alpestris alpestris</i> (KOLENATI, 1848)	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Limnophilus ictus</i> WAGA, 1857 + <i>Phryganea pilosula</i> ZETTERSTEDT, 1840	<i>Rhadicleptus alpestris alpestris</i> (KOLENATI, 1848) ist in Deutschland und Nordeuropa verbreitet, ihre vier Subspezies haben begrenzte Verbreitungsgebiete in Spanien sowie im östlichen Europa von Polen bis Griechenland.
252	<i>Rhyacophila aquitanica</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		keine bekannt	
253	<i>Rhyacophila aurata</i> BRAUER, 1857	Spezies		keine bekannt	
254	<i>Rhyacophila bonaparti</i> SCHMID, 1947	Spezies		<i>Rhyacophila alpina</i> VAILLANT, 1968	
255	<i>Rhyacophila dorsalis dorsalis</i> (CURTIS, 1834)	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Rhyacophila confinis</i> NAVAS, 1920 + <i>Philopotamus longipennis</i> CURTIS, 1834 + <i>Rhyacophila obtusidens</i> McLACHLAN, 1879 + <i>Rhyacophila opaca</i> STEPHENS, 1836 + <i>Plectrocnemia senex</i> WALKER, 1852 + <i>Rhyacophila stigma</i> STEPHENS, 1836 + <i>Rhyacophila vulgaris</i>	<i>Rhyacophila dorsalis dorsalis</i> (CURTIS, 1834) kommt im südlichen und südwestlichen Deutschland vor und ist in Luxemburg, Belgien, Frankreich und auf den britischen Inseln verbreitet. Die Unterart <i>Rhyacophila dorsalis persimilis</i> (McLACHLAN, 1879) wird im südlichen Deutschland und im Alpenraum gefunden. Eine genaue Abgrenzung der Lebensräume ist nicht möglich, es werden Übergangsformen beobachtet. Weitere Unterarten sind aus Spanien, Italien und Kroatien beschrieben.
256	<i>Rhyacophila dorsalis persimilis</i> (McLACHLAN, 1879)	Subspezies		keine bekannt	
257	<i>Rhyacophila evoluta</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		keine bekannt	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
258	<i>Rhyacophila fasciata fasciata</i> HAGEN, 1859	Spezies	nominoty- pisches Taxon	<i>Rhyacophila septentrionis</i> McLACHLAN, 1865	<i>Rhyacophila fasciata fasciata</i> HAGEN, 1859 ist von den britischen Inseln und Frankreich bis in den Ural und von Griechenland bis nach Skandinavien verbreitet. Aus Südeuropa und Vorderasien sind weitere fünf Unterarten beschrieben.
259	<i>Rhyacophila glareosa</i> McLACHLAN, 1867	Spezies		keine bekannt	
260	<i>Rhyacophila hirticornis</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		<i>Rhyacophila irrorella</i> KOLENATI, 1859	
261	<i>Rhyacophila intermedia</i> McLACHLAN, 1868	Spezies		<i>Rhyacophila contracta</i> McLACHLAN, 1879 + <i>Rhyacophila fraudulenta</i> McLACHLAN, 1879 + <i>Rhyacophila kervillei</i> NAVAS, 1929 + <i>Rhyacophila linguata</i> NAVAS, 1932 + <i>Rhyacophila proxima</i> McLACHLAN, 1880	
262	<i>Rhyacophila laevis</i> PICTET, 1834	Spezies		<i>Rhyacophila flavipes</i> PICTET, 1834 + <i>Rhyacophila latipennis</i> PICTET, 1834 + <i>Rhyacophila obfuscata</i> PICTET, 1834 + <i>Rhyacophila slovenica</i> SYKORA, 1963 + <i>Rhyacophila viduata</i> NAVAS, 1918	
263	<i>Rhyacophila nubila</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	Spezies		<i>Rhyacophila paupera</i> HAGEN, 1859 + <i>Rhyacophila subnubila</i> MARTYNOV, 1934 + <i>Rhyacophila subnubila</i> MURGOCI, 1953	
264	<i>Rhyacophila oblitterata</i> McLACHLAN, 1863	Spezies		keine bekannt	
265	<i>Rhyacophila pascoei</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		<i>Rhyacophila palazoni</i> NAVAS, 1934	
266	<i>Rhyacophila philopotamoides</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		<i>Rhyacophila centralis</i> SCHMID, 1970 + <i>Rhyacophila orientalis</i> SCHMID, 1970	
267	<i>Rhyacophila polonica</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		<i>Rhyacophila hageni</i> McLACHLAN, 1879 + <i>Rhyacophila hungarica</i> SATORI, 1938 + <i>Rhyacophila margiti</i> KISS, 2002	
268	<i>Rhyacophila praemorsa</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		<i>Rhyacophila delphinensis</i> VAILLANT, 1968	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
269	Rhyacophila producta McLACHLAN, 1879	Spezies		keine bekannt	
270	Rhyacophila pubescens PICTET, 1834	Spezies		keine bekannt	
271	Rhyacophila simulatrix simulatrix McLACHLAN, 1879	Spezies	nominoty- pisches Taxon	keine bekannt	Von <i>Rhyacophila simulatrix simulatrix</i> McLACHLAN, 1879 wurden bisher nur wenige Exemplare in alpinen Regionen Bayerns gefunden. Sie kommt in östlichen Alpenregionen und vom Alpen-Südhang über die Meeralpen bis ins südliche Italien vor. Die Subspezies <i>Rhyacophila simulatrix vinconi</i> SIPAHILER, 1993 wird nur in westlichen Alpenregionen in der Schweiz und Südost-Frankreich gefunden. Vorkommen im angrenzenden südwestlichen Baden-Württemberg sind nicht ausgeschlossen.
272	Rhyacophila stigmatica KOLENATI, 1859	Spezies		keine bekannt	
273	Rhyacophila torrentium PICTET, 1834	Spezies		Rhyacophila valkanovi BOTOSANEANU, 1956	
274	Rhyacophila tristis PICTET, 1834	Spezies		Rhyacophila akutila OLAH, 2010 + Rhyacophila angularis PICTET, 1834 + Rhyacophila biguttata PICTET, 1834 + Rhyacophila chesa NAVAS, 1918 + Rhyacophila pelionensis JAQUEMART, 1957 + Rhyacophila pseudotristis KUMANSKI, 1987 + Rhyacophila umbrosa FJ PICTET, 1834	
275	Rhyacophila vulgaris PICTET, 1834	Spezies		Rhyacophila venusta HAGEN, 1859	
276	Sericostoma flavicorne s.l.	Artengruppe		keine bekannt	<i>Sericostoma flavicorne</i> s.l. bezeichnet eine Gruppe von Arten mit unklarem taxonomischem Status. Weitere Untersuchungen und eine Revision der <i>Sericostoma pedemontanum/personatum/favicorne</i> -Gruppe sind erforderlich.
277	Sericostoma personatum KIRBY & SPENCE, 1826	Spezies		keine bekannt	
278	Setodes argentipunctellus McLACHLAN, 1877	Spezies		keine bekannt	
279	Setodes punctatus (FABRICIUS, 1793)	Spezies		Setodes hiera KOLENATI, 1858 + Setodes martini NAVAS, 1933	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
280	<i>Setodes viridis viridis</i> (FOURCROY, 1785)	Spezies	nominoty pisches Taxon	<i>Setodes punctellus</i> RAMBUR, 1842	Die Unterart <i>Setodes viridis huliethica</i> BOTOSANEANU & GASITH, 1971 wurde aus der Levante beschrieben.
281	<i>Silo nigricornis</i> (PICTET, 1834)	Spezies		<i>Goera dalmatina</i> KOLENATI, 1848 + <i>Silo fumipennis</i> McLACHLAN, 1865	
282	<i>Silo pallipes</i> (FABRICIUS, 1781)	Spezies		<i>Silo duplex</i> HAGEN, 1964 + <i>Aspatherium fuscicorne</i> in the sense of KOLENATI, 1848 + <i>Limnophilus iridion</i> WAGA, 1857 + <i>Silo minutus</i> KOLENATI, 1848 + <i>Trichostoma picicorne</i> PICTET, 1834 + <i>Goera vulgata</i> STEPHENS, 1836	
283	<i>Silo piceus</i> (BRAUER, 1857)	Spezies		<i>Aspatherium fuscicorne</i> in the sense of KOLENATI 1848, not PICTET 1834 + <i>Aspatherium medium</i> MEYER-DUER, 1864 + <i>Aspatherium obtusus</i> HAGEN, 1864 + <i>Ptilocolepus turbidus</i> DZIEDZIELEWICZ, 1883 + <i>Silo vulgatus</i> HAGEN, 1859	
284	<i>Stactobia eatoniella</i> McLACHLAN, 1880	Spezies		<i>Stactobia oredonensis</i> MOSELY, 1934	
285	<i>Stactobia moselyi</i> KIMMINS, 1949	Spezies		keine bekannt	
286	<i>Stactobiella risi</i> (FELBER, 1908)	Spezies		<i>Stactobiella ulmeri</i> SILTALA, 1908 + <i>Microptila risi</i> FELBER, 1908	
287	<i>Stenophylax mitis</i> McLACHLAN, 1875	Spezies		keine bekannt	
288	<i>Stenophylax mucronatus</i> McLACHLAN, 1880	Spezies		<i>Stenophylax crossotus</i> McLACHLAN, 1884 + <i>Stenophylax racovitzai</i> BOTOSANEANU, 1959 + <i>Stenophylax cirratus</i> NAVAS, 1917 + <i>Stenophylax comes</i> NAVAS, 1923	
289	<i>Stenophylax permistus</i> McLACHLAN, 1895	Spezies		<i>Stenophylax concentricus</i> McLACHLAN, 1875	
290	<i>Stenophylax vibex</i> (CURTIS, 1834)	Spezies		<i>Stenophylax speluncarum</i> McLACHLAN, 1875 + <i>Stenophylax speluncarum</i> McLACHLAN, 1875 + <i>Stenophylax striatus flavescens</i> KOLENATI, 1848	
291	<i>Synagapetus dubitans</i> McLACHLAN, 1879	Spezies		<i>Agapetus dubitans</i> McLACHLAN, 1879	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
292	Synagapetus iridipennis McLACHLAN, 1879	Spezies		Agapetus iridipennis McLACHLAN, 1879 + Synagapetus ater KLAPALEK, 1904 + Synagapetus degrangei VAILLANT, 1967	
293	Synagapetus moselyi ULMER, 1938	Spezies		keine bekannt	
294	Tinodes assimilis assimilis McLACHLAN, 1865	Spezies	nominoty pisches Taxon	keine bekannt	Die Subspezies <i>Tinodes assimilis rifensis</i> BOTOSANEANU & GONZALEZ, 2001 kommt nur im Rif-Gebirge in Marokko vor.
295	Tinodes dives dives (PICTET, 1834)	Spezies	nominoty pisches Taxon	Tinodes bidentatus NAVAS, 1916 + Hydropsyche flavicoma PICTET, 1834 + Hydropsyche humeralis PICTET, 1834 + Tinodes dives jeekeli BOTOSANEANU, 1980 + Rhyacophila laevigata FJ PICTET, 1834 + Hydropsyche nigripennis FJ PICTET, 1834 + Hydropsyche	<i>Tinodes dives dives</i> (PICTET, 1834) ist in montanen Regionen Mitteleuropas bis zu den Pyrenäen im Süden und den britischen Inseln im Norden verbreitet. Die Subspezies <i>Tinodes dives consigloi</i> BOTOSANEANU, 1980 ist in Italien verbreitet, aus Spanien wurde <i>Tinodes dives cantabricus</i> BOTOSANEANU & GONZALEZ, 2001 beschrieben.
296	Tinodes kimminsi SYKORA, 1962	Spezies		keine bekannt	
297	Tinodes maclachlani KIMMINS, 1966	Spezies		Tinodes aureola HAGEN, 1864 + Tinodes pusillus WALKER, 1852	
298	Tinodes maculicornis (PICTET, 1834)	Spezies		Tinodes muticus NAVAS, 1924 + Tinodes spinosus NAVAS, 1923	
299	Tinodes pallidulus McLACHLAN, 1878	Spezies		keine bekannt	
300	Tinodes rostocki McLACHLAN, 1878	Spezies		keine bekannt	
301	Tinodes unicolor (PICTET, 1834)	Spezies		Hydropsyche urbana PICTET, 1834	
302	Tinodes waeneri waeneri (LINNAEUS, 1758)	Spezies	nominoty pisches Taxon	Tinodes annulicornis STEPHENS, 1836 + Tinodes flaviceps STEPHENS, 1836 + Tinodes flavipes HAGEN, 1860 + Phryganea griseola ZETTERSTEDT, 1840 + Philopotamus longipennis RAMBUR, 1842 + + Hydropsyche microcephala PICTET, 1834 + Tinodes luridus	<i>Tinodes waeneri waeneri</i> (LINNAEUS, 1758) ist von Skandinavien bis Griechenland und nach Westen von den britischen Inseln entlang der Atlantikküste bis Marokko verbreitet. Von Mallorca wurde die Subspezies <i>Tinodes waeneri pollensa</i> MALICKY, 1987 und von Sizilien die <i>Tinodes waeneri marae</i> DE PIETRO, 2000 beschrieben.
303	Tinodes zelleri McLACHLAN, 1878	Spezies		keine bekannt	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
304	<i>Triaenodes bicolor</i> (CURTIS, 1834)	Spezies		<i>Setodes auripilis</i> BREMI, 1864 + <i>Mystacida ferruginea</i> RAMBUR, 1842 + <i>Setodes fuscus</i> BRAUER, 1857 + <i>Phryganea ochrata</i> ZETTERSTEDT, 1840 + <i>Leptocerus rufogriseus</i> STEPHENS, 1836 + <i>Mystacides rufus</i> KOLENATI, 1858 + <i>Leptocerus tineoides</i> HAGEN, 1860	
305	<i>Triaenodes unanimitis</i> McLACHLAN, 1877	Spezies		keine bekannt	
306	<i>Tricholeiochiton fagesii</i> (GUINARD, 1879)	Spezies		<i>Leiochiton fagesii</i> + <i>Leiochiton felina</i> + <i>Synagotrichia fortensis</i> ULMER + <i>Oxyethira felina</i> RIS, 1897	
307	<i>Trichostegia minor</i> (CURTIS, 1834)	Spezies		<i>Phryganea mixta</i> BURMEISTER, 1839 + <i>Phryganea tortriceana</i> RAMBUR, 1842 + <i>Nannophryganea MARTYNOV</i> , 1924 + <i>Phryganea minor</i> CURTIS	
308	<i>Wormaldia copiosa copiosa</i> McLACHLAN, 1868	Spezies	nominoty- pisches Taxon	<i>Hydropsyche columbina</i> PICTET, 1834 + <i>Dolophilus cuprosus</i> OBENBERGER, 1952 + <i>Dolophilus copiosus alticola</i> VAILLANT, 1974 + <i>Dolophilus copiosus calcicola</i> VAILLANT, 1974.	Die Nominatform <i>Wormaldia copiosa copiosa</i> McLACHLAN, 1868 besiedelt den gesamten Alpenraum sowie montane Regionen in Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Kroatien. Die Subspezies <i>Wormaldia copiosa botosaneanui</i> MORETTI, 1981 ist von den ligurischen Alpen bis nach Mittelitalien verbreitet.
309	<i>Wormaldia mediana mediana</i> McLACHLAN, 1878	Spezies	nominoty- pisches Taxon	keine bekannt	<i>Wormaldia mediana mediana</i> McLACHLAN, 1878 kommt in Mitteleuropa von Norditalien bis zu den britischen Inseln vor. Ihre Subspezies <i>Wormaldia mediana nielsenii</i> MORETTI, 1981 lebt in Italien nach Süden bis Sizilien.

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
310	<i>Wormaldia occipitalis occipitalis</i> (Pictet, 1834)	Spezies	nominoty- pisches Taxon	<i>Hydropsyche columbina</i> Pictet, 1834 + <i>Wormaldia lambda</i> Navas, 1934 + <i>Philopotamus longipennis</i> Brauer, 1857 + <i>Tinodes (Oncocerus) pallescens</i> Kolenati, 1859 + <i>Philopotamus ramburii</i> Kolenati, 1859 + <i>Aphelocheira subaurata</i> Stephens, 1836 + <i>Wormaldia trifida</i> Andersen, 1983 + <i>Wormaldia serratosioi</i> Vaillant, 1974	Ältere Meldungen von " <i>Wormaldia occipitalis</i> " können sich auf die beiden früher synonymisierten Arten <i>Wormaldia occipitalis occipitalis</i> (Pictet, 1834) oder <i>Wormaldia subterranea</i> Radovanovic, 1932 beziehen, die von Neu (2015) als klar getrennte Spezies wiederbeschrieben wurden und beide in Deutschland vorkommen.
311	<i>Wormaldia pulla pulla</i> (McLachlan, 1878)	Spezies	nominoty- pisches Taxon	keine bekannt	Die montane <i>Wormaldia pulla pulla</i> (McLachlan, 1878) ist in Europa vom Zentralmassiv über die Alpen und die Karpaten bis in gebirgige Regionen Griechenlands verbreitet. Ihre Subspezies <i>Wormaldia pulla marlieri</i> Moretti, 1981 ist von den ligurischen Alpen im Nordwesten Italiens über die Gebirgsregionen Mittelitaliens bis in den Südwesten nach Calabrien zu finden.
312	<i>Wormaldia subnigra</i> McLachlan, 1865	Spezies		keine bekannt	
313	<i>Wormaldia subterranea</i> Radovanovic, 1932	Spezies		<i>Wormaldia occipitalis</i> (Pictet, 1834) + <i>Wormaldia triangulifera</i> McLachlan, 1878	<i>Wormaldia subterranea</i> Radovanovic, 1932 als gute Art bestätigt und wiederbeschrieben von Neu (2015)
314	<i>Wormaldia triangulifera</i> McLachlan, 1878	Spezies		Nov. syn.: <i>Wormaldia variegata vercorsica</i> Vaillant, 1974. The subspecies <i>Wormaldia triangulifera laticerca</i> Vaillant, 1974 is a hybrid.	Ältere Bestimmungen von <i>Wormaldia triangulifera</i> McLachlan, 1878 aus Mitteleuropa, die mit den Arbeiten von McLachlan, 1874 oder Ulmer, 1909 identifiziert wurden, sind recht sicher <i>Wormaldia subterranea</i> Radovanovic, 1932.
315	<i>Ylodes conspersus</i> (Rambur, 1842)	Spezies		<i>Trienodes conspersus</i> Rambur, 1842 + <i>Trienodes alluaudi</i> Navas, 1936 + <i>Mystacides rufogriseus</i> Kolenati, 1858 + <i>Trienodes tinmelinus</i> Navas, 1930	
316	<i>Ylodes detruncatus</i> (Martynov, 1924)	Spezies		<i>Trienodes detruncatus</i> Martynov, 1924	

Nr	Taxon	Status	Nomenkl.	Synonyme	Anmerkungen und Hinweise
317	Ylodes kawraiskii (MARTYNOV, 1909)	Spezies		Triaenodes kawraiskii MARTYNOV, 1909 + Triaenodes conspersus banaticus BOTOSANEANU, 1958	
318	Ylodes reuteri (McLACHLAN, 1880)	Spezies		Triaenodes reuteri McLACHLAN, 1880 + Triaenodes griseus BANKS, 1899	
319	Ylodes simulans (TJEDER, 1929)	Spezies		Triaenodes simulans TJEDER, 1929 + Triaenodes forsslundi TJEDER, 1941	